

Antler^{MC}

Pour une utilisation dans le canola, les légumineuses et autres cultures à feuilles larges, Antler est un herbicide de postlevée pour le contrôle des graminées.

Antler est absorbé par les feuilles et rapidement transloqué vers les points de croissance des feuilles et des tiges. Les graminées susceptibles en croissance active arrêtent de se développer dans les 48 heures suivant le traitement. Selon l'espèce, les conditions de croissances et la compétition de la culture, les feuilles et les points de croissance tourneront au jaune une à trois semaines après l'application. Un changement de couleur plus marqué et une perte de vigueur seront observés, suivis d'un brunissement, et le contrôle complet trois à cinq semaines après l'application.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Peut être mélangé en réservoir avec plusieurs différents herbicides à feuilles larges, incluant le Liberty^{MD}, pour obtenir un désherbage à large spectre.
- Peut être utilisé sur plusieurs cultures à feuilles larges.
- Possède une large fenêtre d'application.
- Résiste au lessivage par la pluie 1 heure après l'application.

Pour une utilisation sur (incluant, mais non limité à*) :

Canola | Pois chiches | Pois secs | Lin | Lentilles | Moutarde | Pommes de terre | Soya
*voir l'étiquette pour la liste complète des cultures enregistrées

Temps d'application

La plupart des cultures sont tolérantes à tous les stades, l'application doit viser le stade optimal des mauvaises herbes. Voir l'étiquette pour plus d'information.

Mauvaises herbes	Stade des feuilles	Taux
Folle avoine, avoine volontaire, sétaires verte et glauque, céréales volontaires (blé, orge, avoine)	2-4	125 ml/ha
Échinochloa pied-de-coq, panic d'automne, panic millet, maïs volontaire, alpiste volontaire, panic capillaire	2-6	125 ml/ha
Échinochloa pied-de-coq, digitale (astringente, sanguine), panic d'automne, sétaires (verte et glauque), ivraie de Perse, panic millet, suppression du chiendent, alpiste volontaire, céréales volontaires (blé, avoine, orge), maïs volontaire, folle avoine, panic capillaire	2-6	200 ml/ha
Contrôle du chiendent	2-4	370 ml/ha



RÉGION

Toutes



TAUX D'UTILISATION

Voir le tableau ci-contre



GUIDE D'APPLICATION

Voir le tableau ci-contre



EMBALLAGE

Contenant de 3 L +
9 L d'adjuvant



INGRÉDIENT ACTIF

Cléthodime 240 g/L

Toujours lire et suivre les instructions de l'étiquette © 2020 WinField United. Antler^{MC} et WinFieldSM sont des marques enregistrées de WinField United.

Toutes les autres marques sont la propriété de leur propriétaire respectif.

winfieldunited.ca